

**DISSERTATIO
INAUGURALIS
MEDICA DE
HAEMORRHOIDIB
US QUAM...**

Wenceslaus Knoll



DISSERTATIO
INAUGURALIS MEDICA
DE
HAEMORRHOIDIBUS

QUAE
CONSENSU ET AUCTORITATE
ILLUSTRISSIMI AC MAGNIFICENTISSIMI DOMINI
PRAESIDIS ET DIRECTORIS
PERILLUSTRIS AC SPECTABILIS DOMINI DECANI

RECTORIS
CLARISSIMORUM D. D. PROFESSORUM
PER
DOCTORIS MEDICINAE GRADU

RECEPIT
IN ANTIQVARIANA AC CELEBRATISSIMA
VNIYERSITATE PATAVINA
PUBLICA DISQUISITIONE SUBMITTIT
WENCESLAUS KNOLL

DOMINUS BOVINITIENSIS

PATAVII

EX OFFICINA VALENTINI CRESCENTI

MDCCLXXIX





MORBI DEFINITIO.

Hæmorrhœia Germanis *die gelbete Ader*, Italia *Emorrhoidi*, secundum æthiologiam nominis *adæ sanguis*, ꝑ. suo, nil aliud quam profluvium sanguinis designat. Antiqui autem medici hanc distinctionem facere conati, intellexerunt sub hæmorrhœgia profluvium sanguinis ex parte organorum humani aliquo, ad quam simul nomen partis ipsius addiderunt, ut illa exactius determinaretur, et sub hæmorrhoidibus designarent profluvium sanguinis ex vasis intestinali recti. Consiliarius nobilis et Helmsædæ celestissimus meus præceptor sequentem definitionem statuit: Hæmorrhœia est symptoma unum, per quod se morbus hæmorrhoidalis in majori evolutionis gradu manifestat, et consistit in profluvio sanguinis partim pari, partim cum mæce et faecibus mixti, ex vasibus intestinali recti inferioribus.

Descriptio morbi.

Symptomata per quas se haemorrhoides manifestant, diversa et hinc diversissima sub forma adparent, et medicum ad saltem morbi determinationem adducunt. Hinc ut faciliorem morbi diagnosis acquiescam, rem ita disposui ut 1.^o dispositionis, 2.^o morbosae, et 3.^o fluxuum haemorrhoidum symptomata recensentur.

a) Symptomata dispositionis per haemorrhoidibus.

Haecc conducit in viduata circulatione sanguinis per viscera abdominalia, praecipue vero per systema venae portarum; hinc ea symptomata, per quas se se dispositio manifestat ad statum morbosum huius ventris, qui mox magis ad hepatis, mox ad lienis, mox ad vasa systematis venae portarum restrictus est, designant. Talis dispositio per menses, imo per annos perire potest, quia verus fluxus adparet, talique dispositio saepe saepius in alios morbos chronicos, uti lenter, hydrops, haemoptoe transit.

Symptomata constitutiva dispositionem concordantia sunt: digestio turbata, pressio, tensio in regione epigastrica, anasarca, ructus acidi, flatulentia, symptoma uteri, super anasarca, lingua obducta, sensationes molestae in abdominalibus visceribus, tensiones in praecordia, alvus mox obstipa, mox diarrhoeica, aut totum a) symptomatum hypochondriae consensuum. Congestionem verum caput, postus, abdomen, inde calor fugax, cefalea, anasarca aurium, vertigo, respiratio difficilis, anxia, sensus urticae, pressiois puncturae in pectore. Color faciei pallido livens, a-

culi in orbitam retrahi, oculis caeruleis claudi, palpebrae frequens, parvae, intermittens.

β) Symptomata moliminae quas lurae in localia et universalia subdividentur, sunt:

1) Localia gravamina in intestino recto, acrius enim agnoscunt in majore sanguinis affluxu ad vasa hujus intestinali, et in extensione vasorum haemorrhoidaliū, symptomata inde profluentia sunt: sensus calorici, gravitativi, dolorici, tenentis, tensio in regione sacrali per dorsalem et lumbalem vias extendentes; pruritus molestus in orificio ani.

2) Ad symptomata universalia corpus spectantia numeramus: peristolem, tensionem in hinc ventre obdipaticam alibi, erectioes, polationes, stimulum in ventera, urinas rubellas, sedimentoque araneas, cephalaeas, occipitales speciatim vertigines, earum aurium, visionem punctorum nigrorum. Colorem faciei flavicantem, linguam obductam, morositatem. Haecce signa per diversum tempus corpus humanum vexant, disparent et inde terminato interdicto redire solent, praecipuis per errorem dieteticum, abusum venariae, tensionem protractam, refrigerium capsum, et ipsa pro moliminibus morbi haemorrhoidalis tunc sunt declaranda, quando simul aduunt localia, quando alternant localibus vel localia sequuntur.

3) Symptomata fluentium: tensio in regione sacrali, tenentis aucti, horripilationes universales, sensus ac si guttae aquae calidae, aut aer tepidus per anum dependereut, ostendant molimina in fluentes haemorrhoides transgressura. Antecedit alvus dura cum molestiis deponenda, ubi dein fluxus ipse apparet. Sanguis excreatur vel cum vel post deposi-

tionem alvi ipse est lacte ruber, foidos, cum moco, mixtus, quantitas diversa aut guttales necnullo, aut plures unciar. Sanguis evacuato notabilia remanent symptomata molimina concomitantium, aut plenaria evanescentia. Saepe unica vice talis evacuatio, saepius vero repetitis vicibus aequi solet. Post primam evacuationem sanguinis, subsequae tot certum typum observant, aut non, aut penitus emutant. In individuo illis, ubi cadere solet, fere semper molimina antecedunt, haec ante et sub fluxu maxima evadere, doloresque vehementissimos in abdomine, rectum, palpitationem cordis, respirationem anxiam, cephalicam saepe causant.

Haec sunt symptomata haemorrhoidum flaccidarum, existit vero alia species ad hoc, quae sub nom coccarum in vita communi occurrit. Est nimis ubi ex congestione sanguinis ad vasa haemorrhoidalia et alia, nulla inde oritur haemorrhagia, sed tunc tactis, tunc sub senis percussis, pulsationis, tendentis, caloris et ardoris vasa sanguifera in tubercula extenduntur, vel etiam sanguis ex vasa tunc memoratis sub tunica interna intestini recti effunditur, et sic dictus schismos producit, saepe cum fluxibus conjunctis. Ab initio tubercula minima, coloris caerulei, rubri vel nigrescentis, in mochi decora crescunt, et necesse magnitudinem saepe attingunt. Quo ad numerum ab initio pauciores, multiplicante tempore crescit; sedes horum tuberculorum est aut externa ad limbum ani, aut interna in tubo intestinali. Si externe numerosiores, sunt, coadunant, et integrum ani limbum nulli ad hunc cingunt. Sed ubi rectum vult, evacuatione alvi summa virum intensione per-

scites, noduli ipsi non nimis remota ab orificio sui protrahuntur, attenuis sub doloribus recedunt initio morbi sponte, tractu temporis extrorsum locati manent, et modo artificiali tantum repari possunt. Non rarus est, sub nimia irritatione intestini recti per protrusionem membranam, ille tumescere, inflammari, ulcerari, indurari et fistula ipsa progrediendi posse.

Divisio hæmorrhoidum.

Considerata cum angustia profluvium quatenus vel ex arteriis vel venis originem suam repetit; primam hæmorrhoidum divisionem arterialem et venosam nuncupari. Obijcere quidem posset aliquis, quid divisio in arterialem et venosam, cum angustia ex venis tantum profuit? Si certum esset, angustiam ex sola venis pendere, tunc omnino statuta divisio falsa esset; sed non habemus in hoc morbo angustia signa congestione activam in arteriis instantia recti demonstrata? non habemus profluvium sanguinis characteris manifeste aperteque arterialis?

Aliam divisionem sumpti ex prioribus collatis, quatenus vel certo determinatoque tempore adparet nec non, et prioribus concessi nomen *regulares*, secundum *irregulares*. Divisio secundum quantitatem in *largas* et *parvas*. Priori involucitur in affectione morbois viscerum abdominalium, in dispositione manifestans hæmorrhoidali sæpe hæreditaria, in paralyi vasorum, abusu remediotorum stimulantium, es-leficiantium, edulcorantium, pellentium.

Secundum quantitatem quatenus vel sanguis purus, vel muco, vel nihil evacuetur, dividi possunt in hæmorrhoides sanguineas, mucosæ, coaræ.

Distribueri valentur haemorrhoides in simplices et complicatas, ex sola debilitate vasorum intestinali regni, videntur originem suam repetere simplices. Complicationem sinitur possunt morbi, per quos excitatur ille fluxus, uti sunt: infarctus hepatis, litis, hypochondria, hysteria materialis, aut qui ab haemorrhoidali affectione dependent, uti spasmus, evacuationes alvinae dolorificae, haemorrhagiae largae, morbi organici intestinali recti, organorumque vicinorum.

Haemorrhoides nominantur anormales profluvia sanguinis ex aliis humani corporis partibus, quae vires gerunt fluxus haemorrhoidalis suppositi. Apparent vel sub forma metrorrhagiae haemoptoe. Diagnosi huius profluvii summi momenti et multis acrie difficultatibus praemissae, praecipua tunc ubi ab initio iam ac vicariae adparent. Profluvia sunt:

a) Ex pulmonibus ubi sanguis indolla venosae evacuetur, individuaeque illa disposita videntur quae aetate infantili haemoptoe laborant et habitum phthisicum praeserunt.

b) Ex ventriculo c) ex vagina uteri d) ex renibus (haemorrhoides renales) rarius ex foveolis, palato molle, apertis, papillis mammarum, umbilico.

Ultima diviso quam cum aliunde praetere non censeo, est in haemorrhoides suppressas et obstructas. Fluxu praesente accidentisque cum uocis illam impediens haemorrhoides suppressae dicuntur. Momenta illam suppressionem conantia sunt: (a) quae statum spirituum vasorum adhaerent, uti terror et metus (b): quae irritabilitatem deprimunt, congestionem et haemorrhagiam illam impediunt; e. g. morbus uterinus, tristicia (c): quae vasorum angustiam fœderant

sim immediatam contractionem præferant, ut refrigerium possint, remedia adstringentia localia, acetata frigida (d): quæ modo revulsivo congestionem venarum vasa hæmorrhoidalia impediunt, uti nonnullis venærectis in brachio. Obstructæ, ac stiles morbosæ ac tempore sunt declarandæ, si per eorum emanationem sese insinuant symptomata morbosæ, cum debili dispositione, æ. g. laxitate intestini recti, aliis aliisque malis posthæc cedunt, nulla tamen pro statu vitæ anomalæ declarandæ sunt.

Ætiologia.

Causam hæmorrhagiæ hujus nisi ex læsione aliqua certa est, consistere in statu æsthetico vel paralytico vasorum digestum, neminem non laebet. Quod synocha sæpius vero æsthetismus subleat, vix dubium existit, potestque ex symptomatibus hæmorrhoidum æterioidorum — paralyti ut plurimum symptomatibus in febre putrida, scorbuto aliisque cachexiis aut quæ ætate jam præventiore evolvuntur, evincuntur. Quæ in ætate venosæ sunt, oriuntur vel ex paralyti, vel ex læsione organica, præcipue repleta vetricum. Ut eas omnes dividi possint in dispendentes et exaltantes, sic et hæc divisio illa locum habere potest.

Ad causas dispositivas numerari moventur:

1. *Ætas virilis.* Notum omnibus certe est, evolutionem corporis in hæc ætate perfectam jam esse, notumque omnibus est, tandem sanguinis allicentem

convertendam esse, et quidem ad illa loca, ubi resistendum minimam intencit; et ubi erit minor resistentia quam in visceribus abdominalibus? Constatum esse insistenti insistentisque ab anno trigesimo ad quinquagesimum usque.

b) *Sexus masculinus.* Causa videtur latere in eo, quod ex una parte in foemina sanguis ad istam ventrem congestus per menstruum fluxum evacuetur; ex altera parte foeminae infusae nostrae haemorrhoidibus frecentes non adeo adstant, ut sexus alter, e. g. vitam leniorem, abusus spirituosorum.

c) *Regiones locales.* Frequenter apud populos septentrionales regiones colicas, quam apud meridionales.

d) *Temperamentum cholero-melancholicum*, quod perceptum in singularem debilitatem et sanguinem humorem viscerum abdominalium et vena portarum tollunt.

e) *Hypochondriaca et hysterica affectio.* Quod medico certe notum est, in illis spasmus frequentiores occurrere, ubi dein sanguinis refluxu impedito, remorem patitur et in recto hinc accumulatur, varices causat, quae denum rumpuntur.

f) *Secretiones aliae angustiae suppressae*, ubi sanguis per vicariam secretionem unquam eliminatur.

Ad causas autem dispositionis praesentis, fluxum illum provocantes, pertinere censeo:

1) Illa, quae irritabilitatem vasorum haemorrhoidalem exaltant, congestionem producant, actusque haemorrhoides proferunt. Ad ordinem hanc pertinent: abusus potulentorum spirituosorum, vini, cremati, cerevisiae, vegetabilium acri principio gauden-

dum, aliis, cepis, cinapi, medicamentorum resinum cum oleo aethereo continentium.

1) Talia quae irritabilitatem in abdomine deprimunt, expansionem in vasis sui vasa angust, et hac ratione haemorrhoides characteris passivi praeficiunt. In classem hanc referuntur: vituli pathematis, deprimentia, vita sedentaria, cibi et potus relictus, iuscula multo calida, abusus theae, nutrimenta fluctuantia crassiora.

2) Causae locales quatenus vel exaltando irritabilitatem activas congestiones, vel deprimendo, relaxationem vasorum haemorrhoidalem creant. Ad priora referenda esse censeo: cuncta, suppositoria irritantia, corpora peregrina in intestino recto, ut vermes, faeces acriter: ad secunda, cuncta relaxantia, vapores calidi, somno protrahere sub evacuatione alvina.

3) Omnia quae circulationem in organismo humano modo mechanico impediunt, v. g. vestimenta corporis nimis stringentia, uterus gravidus, tumores organorum abdominalium, intestini recti vitia organica, prolapsus vaginae et sim.

Prognosis.

Haemorrhoides spontaneae medici paravid, moderata quantitate fluxus, ad statum aetatis numerant epianthes, hac ratione naturam singularem expellere superfluum, ejusque discretionem. Certum quidem est profluvio hocce exarminato quoad effectum quod in individuis consuevis salutare dici meretur, quatenus per profluvium ipsam morbus gravior erum;

pena minori tollatur. Sed ad quae attentionem medicus in morbo hocce converterenda habeat, sunt:

1) *Character fluxus.* Fluxu activo non solum pro-droma mitigatur, sed et alia symptomata originem suam inde repetentia, ut: congestiones versus caput, pectus, abdomen. Stipitatae vero cum character'e passivo ut in febre putrida et scorbuta, infanctam plerumque in omnibus admittunt. Haemorrhoides venosae si quantitas sanguinis profusae non est nimis, prognosim relative bonam admittunt. Per illas mitigari videmus hypochondriam, melancholiam, iteram, arthritidem.

2) *Relationes causales.* Haemorrhoides per momenta externa, transitoria, accidentalia producta et activam fluxum causantes, prognosim non indubiam statuere possunt. Illae vero, quae originem suam adscribunt dispositioni universali, prognosim secundum possibilitatem hancce inferendi, secundum utilitatem pro individuo ipso diversam penere audent.

3) *Quantitas et duratio fluxus.* Nimis cruentis angustia, praesertim praecoxa nocere potest; acipius factus notabilis sit per solem durationem praevocansque debilitatem in omnibus functionibus, circulatoria, debilitatem veram, hydropem, scorbutum.

4) *Aetas aegrotantis.* In aetate infantili, juvenili haemorrhoides sanitatem laesuram, dispositionem ad morbos futuros chronicos imi ventris designant; praesente graviditate abortum saepe produciunt; tota aetate character'e paralytico stipitatae studio periculisque sunt.

5) *Complicatio cum infectibus hepatis, lienis, hydropis, abscessibus, fistulis, ulceribus, scirrho.* In co-

in hacce prognosi dependet a periculo quod determinatur per morbum complicatum.

6) Suppressio hæmorrhoidum, vel fluxa illarum, cohibita, vel rursu ad eam alio multiplici modo effluere ipsamque mortem causare queunt, præcipua ad hæmorrhoides criticas aut habituales fuerit. Mala inde orta eam derivantia sunt: vertigo, melancholia, mania, apoplexia, paralysis, respirandi incommoditas, febres inflammatoriae, metastases ad organa nobiliora, febres chronice, lentae, hecticæ, inflammationes partium distantium. Nec negligendæ sunt hæmorrhagiæ vicariæ omni generis, præcipua, epistaxis, hæmoptoe, hæmatemesis, hæmaturia. His ut series malorum ex interruptioe hæmorrhoidum claudatur, adduntur, alius cunctis nulla arte humana remedianda: dysuria, ischuria, hæmorrhoides cecæ, varices aliis in partibus ab una eadem remedia.

Therapia.

Prima indicatio consistit in remotione causarum, ad quam implendam causæ remotæ auferri debent, hinc 1.^o dispositionem, in qua consistat morbus omnia illa amovenda veniunt, quæ circulationem morbosam præcipua venæ portarum, hinc infarctus hepatis, lienis, glandularum mesentericarum solvantur. Curatio lente procedit, multaque premittit difficultatibus et medici atque ac aegri postulat patientiam indefinitam. Adhibetur; Ext. Taraxaci, aspenarum, granis cum parva dosi adsum neutralium; apo; majori in gradu Ext. Chelidonii majoris, cicutæ, ac timonialis, Mercurialis, balnei mineralis, inunctiones, diastæque stricta.

2) Haemorrhoides originem suam derivantes ex potentia stimulantibus, excitantibus, sibi expostas peccatis, cedunt, ut sunt; Oles, emulsiões, maceratio dietam antiphlogisticam. In gradu irritationis majoris, sub affectibus inflammatoriis localibus uni, hirudines et ipsa venesectio indicantur.

3) Quod si haemorrhoides ex motu debilitantibus paralyticis indolentibus oriuntur, ut in febre putrida, scorbuto aptius debellantur adgrediendo congruis remediis morbos, ex quibus scaturiant; ubi autem ex debilitate et paralyti ad intestina restricta possunt, vota medici respondent remedia emollientia v. g. Est. Ceraur. minoris. Marsh. Millefolii, ad emollientia, cuncta tamen cum circumspectione et non majori in numero.

4) Mechanicae causae externae circulationem impediētes, removendae, et ubi morbus haemorrhoidalis a motu localibus intestinum rectum, vel debilitando, vel irritando adjuvantibus promanet, haec sollicite pro eorum diversitate varia ratione amovendae sunt sic v. g. alvus obstipa laeviter roboranda, sanguis eliminanda.

II. Haemorrhoides fluxiles pro vario suo characteris graduque differenti, diversa ratione tractantur.

A) Haemorrhoides fluxiles characteris activi sunt semper in relatione ad universalem et localem affectionem criticam, et supprimendae non sunt. Hoc conveniant: Dieta tenuis, antiphlogistica, potus acidulus, situs horizontalis; et ordine remediante: Nitrum, Ceraur tartari, emulsiões oleosae, tunc vero praecipue ubi ex drasticorum effecta compertuerint.

T, . vero attendis universalis quidem, sed major

vasorum abdominis debilitas sanguinis in his ipsis congestioni morbosae causam paraverit, tunc ab illis quae vires infringunt, abstinendum, et ad ea, quae ipsam erigunt conflegendum est. Ab initio laetanda mixtura, infusum aquosum ex Achillaeae Millefolii summis, vel ex floribus chamomillae, frictio levis abdominis indicata sunt. Ab his, prioribus non sufficientibus, transire possumus ad remedia amara adstringentia fortiora, Infus. Salviae, decoct. rad. Tormentillae, corticis Simarubae, chinae, martialia, stumen, acida mineralia. Haemorrhoides per paralysem formatae, sibi praeter remedia interiora etiam externa exposcunt. Quae hic commendantur sunt: epitemata ad anum, genitalia, et regionem sacralen, ex aqua frigida, glacie, infusis plantarum adstringentium, aceto, alcoholi, acidis mineralibus mixta. Si relata non juverint tunc listacum convolutum vel sacculo filo, quo deinde extrahi possunt munitae et super dicta remedia adstringentibus impregnatae in anum caute inseruntur. Si vero sanguinis unda ex tuberculis scaturiens, dicta jam media dicti non possent, tunc tubercula operatione chyrologica extirpanda et hac ratione fontes rivulorum sanguineorum destruendi sunt.

III. Tractatus haemorrhoides secundum relationes et proprietates accidentales.

Haemorrhoides regulares fluentes maxima ex parte sunt criticae, sublevent seipsum et alios morbo saepe gravioris praecursori. Ideo nec supprimendae, nec impediendae sunt. Dieta congrua, evasio remedium calefacientium, tonicorum, principio tamino gaudendum, sufficiunt. Irregulares, quae prius regulares fuerint, seipso letamen adferbant, nunc animum supprime-

latur, et alii merbi inde oriebantur; in talibus indicatio est, illas resoluere; externe hinc motus corporis diligens, equitatio, cucurbiturarum applicatio ad internas foemorem pariet, hirudines ad anum, caecata ex sal. colicario, Oxy mel. squil. Internae illa quae actus congestiones in vas abdominalibus nominata in vase haemorrhoidalibus producant, et inde nomen pellentium accepissent. Haec sunt purgantia crassa drastica. Apparentibus debita therapia instituta, sanescunt; sunt, per pediluvia, cataplasmata emollientia, interne sulfur, Cremer tart. cum et sine Nitro.

Hæmorrhoides coecæ triplicem differentiam præferunt, quæ in therapia rationali non sunt negligendæ.

1) Pendens hæmorrhoides coecæ a solo exitu exterioris, quæ extensionem vericosam debilitatemque vasorum localem intestini recti produxerunt. In illis topicus remedium adstringentium non convenit. Vericibus multo dilatatis sanguine, opus est, illas per adhesionem hirudinum, vel ope lancule evacuaré, et demum adstringentia utiliora in usum trahere, ut epithemata, enemata ex aqua frigida; his frustra exhibita, Decoct. cort. Quercî, rad: Tormænilles indicantur.

2) Repetentes originem suam ex actus congestione arteriosa, ubi repletio venarum secundaria est, morbus a quo dependet, debita therapia curandus.

3) Sunt maxime sequelæ venosi sanguinis in visceribus abdominalibus. Haec in cura sæpe acerbissima sunt, et indicatio semper est, status illas solvere.

D) Peculiarem attentionem, propriamque tractamentum sibi expescunt morbi nonnulli, qui in sexu citius cum haemorrhoidibus existunt: hoc spectant.

Haemorrhoides suppressae, facillime morbos graves antagonisticos, ut haemorrhagias, inflammationes organorum nobilium causant. Hinc primum quoad indicentem est, est fluxum illum restituere.

Remedia differenti in eam etiam differenti applicanda et sunt aut antiphlogistica, aut antispasmodica.

Quoad regimina dieteticum, non ubique unum idemque, sed variat pro charactere et gradu morbi aliisque circumstantiis. Haemorrhoidarius optime conducunt: Aer purus, moderata calidus, certus ordo in quiete et motu, labor moderatus, nutrimentis facile digerenda, status non causantis. Noxia sunt refrigerationes, assustiones, vita sedentaria inclinata corpori, abusus somni et vigili, animi pathemata deprimentia. Fructus horrei vitis dulces vel acidi facile diarrhoeam proferunt. Nixia mentis intensio, qua modo antagonistica functiones viscerum abdominalium turbantur, inde frequentia haemorrhoidum in erudita. Potulenta calida uti Thea, potus arabicus dilutus, vins acida juniora aut vetusta calidulenta; in genere omnia haemorrhoidarius attentionem in semetipsum dirigat, et facile determinata ipsi erit, qualla vietas optime respondeat.

THESES

I.

Ferment intestinalis non ex ovis, sed per generationem sequivocam ex tractu cellularum produciuntur.

II.

Musices via in multis morbis salutaris.

III.

Adfectus venarum numerus progredienti respondet hominem culture.

IV.

Formulas nimis compositae medicum de indicatione dubium producit.

V.

Plus medici verba ac medicamenta valent apud aegros meticulosos, multum mobiles, et seniles.

61

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

